



POMMIER - MALUS

La majorité des espèces naturelles de Pommier viennent d'Europe, d'Asie et d'Amérique du nord. Bonsaï à feuilles caduques et de croissance rapide. Très apprécié pour sa floraison printanière et pour la couleur de ses fruits à l'automne.

Emplacement

Même s'il accepte tous les types de climat, il préfère une situation ensoleillée durant toute l'année. En été, il faut le protéger du fort soleil du milieu de journée. Il résiste bien aux gelées, mais il est conseillé de le protéger à partir de températures inférieures à -2°C . Il perdra ses feuilles en Hivers.



Arrosage

Eviter de mouiller les fleurs pendant l'arrosage, car on provoquerait leur flétrissement et leur chute prématurée. Ses racines n'apprécient pas l'excès d'humidité.

Taille

Taille de structure au début du printemps.

Pincement à effectuer avec le bout des doigts en enlevant le bourgeon en croissance et en laissant uniquement les deux premières feuilles. Si on les a laissés s'élargir, couper à une ou deux paires de feuilles. Le pincage s'effectue durant tout le printemps.

Engrais

Apport d'engrais liquide spécial Bonsaï une fois par mois ou engrais organique à la surface de la terre de mars à octobre avec une interruption

en Juillet et Aout. Stopper au moment de la floraison.

Rempotage

Tous les deux ans, au début du bourgeonnement printanier.

Ligature

Au printemps si nécessaire mais Le Pommier ne se ligature pas en général.